

Reginato MC¹, Rassi LS¹, Tamburús VCD¹, Silva FBVB¹, Bedin V²

(1) Pos Graduando em Dermatologia no Instituto BWS

(2) Prof. Dr. Coordenador Geral da PG do Instituto BWS e APS

INTRODUÇÃO:

O vitiligo afeta em torno de 1% da população e é caracterizado por máculas acromicas, de limites nítidos, com forma e extensão variáveis. As causas não estão bem estabelecidas e a evolução é imprevisível. O uso de tacrolimo, estimula a divisão e a migração dos melanócitos, proporcionando melhor qualidade de vida ao paciente, já que lesões em face, extensas ou não, podem acarretar importantes transtornos psicossociais.

OBJETIVO

Relatar caso de vitiligo segmentar em face, que respondeu de maneira satisfatória ao tratamento com tacrolimo 0,1% pomada.

APRESENTAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO

Paciente J.L.S., sexo feminino, 7 anos, com queixa de mancha em face, que iniciou e evoluiu de forma progressiva há mais ou menos 4 meses. Nega prurido e antecedentes familiares.



Exame físico:

Presença de máculas acromicas; de limites nítidos; com aproximadamente 3 cm de diâmetro; em face, acometendo região temporomalar direita e mentoniana direita, predominantemente. À lâmpada de Wood, foi visualizada lesão bem delimitada, branco nacarada, com fluorescência positiva

Foi realizado o diagnóstico de vitiligo segmentar em face e iniciado tacrolimo 0,1% pomada, com aplicação uma vez ao dia. Além disso, também foi prescrito protetor solar e foram realizadas as devidas orientações. Exames laboratoriais foram solicitados, a fim de se descartar associação com doenças autoimunes. Paciente retorna ao ambulatório em menos de um mês, com resultados dos exames normais e melhora discreta do quadro clínico, apresentando algumas ilhotas de repigmentação no centro da lesão. Ao final de um ano, paciente evoluiu de forma satisfatória, com repigmentação quase completa da lesão.



CONCLUSÃO

O caso relatado e as publicações levantadas, confirmam a boa tolerância e o resultado favorável ao uso de tacrolimus 0,1% em crianças portadoras de vitiligo, com lesões localizadas em face, promovendo uma melhor qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

HALDER, R.M; TALIAFERRO, S.J. Vitiligo. In: WOLFF, K. et al. Fitzpatrick Tratado de Dermatologia. Rio de Janeiro: Livraria Editora Revinte Ltda, 2011. p.616-622. TAMLER, C; et al. Pomada de tacrolimo 0,1% no tratamento de vitiligo: série de casos. An. Bras. Dermatol. [online]. 2011, vol.86, n.1 ISSN 0365-0596. SAMPAIO, S.A.P; RIVITTI, E.A. Dermatologia. 3.ed. São Paulo: Artes Médicas, 2007. p.356-360