

**Nascimento J M S<sup>1</sup>, Soares D. A.<sup>1</sup>, Bedin V<sup>2</sup>**

*(1) Pós-graduando da Associação Pele Saudável*

*(2) Coordenador da Pós Graduação da Associação Pele Saudável*

## **INTRODUÇÃO:**

Apresenta-se caso doença de Darier (DD) com resposta à terapêutica com imunomodulador tópico.

## **HISTÓRIA E MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS:**

Paciente masculino, 35 anos, com pápulas hiperkeratóticas foliculares, por vezes confluentes, castanhas, graxentas, nas áreas seboreicas, verrucosidades nas mãos e pés e fissuras distais nas unhas dos pés. Na mucosa bucal, pápulas esbranquiçadas. Odor de ranço. O paciente foi tratado com tacrolimus 0,03% tópico, apresentando melhora. Exame histopatológico compatível com DD.

## **DISCUSSÃO:**

DD é uma genodermatose autossômica dominante relativamente rara. Caracteriza-se por pápulas hiperkeratóticas, graxentas, marrom-amareladas podendo coalescer. Acomete áreas seboreicas e palmo-plantares, além de mucosas (tal qual no caso apresentado). Nas unhas, pode haver fenda em "V". DD é diagnosticada pelas lesões típicas e confirmada pela histologia. O mecanismo de ação sugerido para o tacrolimus nesta entidade, envolve sua ação antiinflamatória.

## **CONCLUSÃO:**

Apesar da DD exuberante ser bastante infreqüente, percebem-se nesta doença estigmas voltados ao odor e à desfiguração. Tal fato impulsiona a procurar opções terapêuticas para os pacientes impossibilitados de usar medicações sistêmicas.



## **REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**

- ⇒ Maj J; Cislo M; Wasik-Kuprianowicz A; Plomer-Niezgoda E Darier disease type 1 Pol Merkur Lekarski; 16(96): 568-70, 2004 Jun.
- ⇒ Sanchez Bermejo C; Fernandez Lopez E A localized form of Darier's disease. Cutis; 66(2): 112-3, 2000 Aug.
- ⇒ Meziane M; Chraïbi R; Kihel N; Hassam B; Senouci K Linear Darier disease. Dermatol Online J; 14(12): 11, 2008.